

Växtskyddsmedel som får användas i betodlingen 2022. Aktuell förteckning mars 2022.

Typ	Verksam substans	Preparat	Verksam substans, g/l(kg)	Reg.	maxdos/år*	Behandlingsintervall	Karenstid/sista behandlingsdag	Registreringsinnehavare
<i>Insektsmedel</i>	Flonikamid	Teppeki	70	4966	140 (140) max 1 gång/år.	BBCH 16-49	60 dagar	NA
<i>Selektiva ogräsmedel</i>	Cykloxidim	Focus Ultra	100	5328	5,0 (5,0) max 1 gång/år.	BBCH 12-39 (2 örtblad till radtäckning)		BASF
	Fenmedifam	Betasana SC	160	4967	Bandspruta: 3,0 (1,0) max 3 ggr/år. Bomspruta 2,1 (0,7) max 3 ggr/år.	Bandspruta: BBCH 10-18 (hjärtblad till 8 örtblad). Bomspruta: BBCH 12-18 (2 till 8 örtblad).	90 dagar. Blasten får ej användas till foder.	United Phosphorus Ltd
		Betanal	160	5685	6,0 (2,0) max 3 ggr/år	BBCH 10-18 (hjärtblad till 8 örtblad)	90 dagar.	Bayer A/S
	Kletodim	Select	240	5468	1,0 (1,0) max 2 ggr/år.	BBCH 12-33. Behandlingsintervall 21 dagar	60 dagar	Nordisk Alkali
		Select Plus	120	5293	2,0 (2,0) max 1 gång/år.	BBCH 12-33 (2 örtblad till radtäckning)		Nordisk Alkali
	Kizalofop-P-etyl	Leopard	50	5624	2,5 (2,5) max 1 gång/år.	BBCH 12-39 (2 till 5 örtblad)	100 dagar	ADAMA
		Targa Super 5SC	50	5547	2,0 (4,0) max 2 gg/år.	BBCH 13-39. Behandlingsintervall 21 dagar.		Nissan Chem.
	Propakizafop	Agil 100 EC	100	5232	1,5 (1,5) max 2 ggr/år. 14-28 dagar mellan behandlingar.	BBCH 00 - 32		ADAMA
	Klopyralid	Matrigon 72 SG	720	5013	0,165 (0,165) max 1 gång/år.	BBCH 12-15 (2 till 5 örtblad)		Corteva
		Matrigon 600 SL	720	5507	0,2 (0,2) max 1 gång/år.	BBCH 12-15 (2 till 5 örtblad)		Corteva
		Cliophar 600 SL	741	5506	0,2 (0,2) max 1 gång/år.	BBCH 12-15 (2 till 5 örtblad)		Nordisk Alkali
	Metamitron	Goltix SC 700	700	5259	3,0 (1,5) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Goltix WG	700	5261	3,0 (1,5) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Goltix Gold	700	5625	3,0 (1,5) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Goliath	700	5260	3,0 (1,5) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Metafol 700 SC/Target SC	700	5264/5265	3,0 (1,0) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		United Phosphorus Ltd
	Metamitron + Kvinnmerak	Goltix Queen	525 + 40	5560	3,0 (1,5) max 3 ggr/år	BBCH 10-19 Behandlingsintervall: Se etikett. Får endast användas vart tredje år.		ADAMA
	Triflusulfuron-metyl	Safari 50 DF	500	5424	120g (30g) max 4 ggr.	BBCH 10-31. Behandlingsintervall: Se etikett		FMC
	Etofumesat	Tramat SC 500	500	5374	0,45 (0,45) max 1 ggr/år. 0,5 (0,25) max 2 ggr/år. 0,42 (0,14) max 3 ggr/år.	Olika behandlingsstrategier får inte kombineras! BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad). Behandlingsintervall: Se etikett		Bayer A/S
	Dimetenamid + Kinmerak	Tanaris	333 + 167	5411	1,5 (0,6 per beh) Max 3 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett	Blasten får ej användas till foder.	BASF
		Centium 36 CS**	360	4778	0,2 (0,05-0,2 per beh.) max 4 ggr/år.	BBCH 00-18 (innan uppkomst - 8 örtblad). Etiketten avråder från körning i stadie 07-12. Behandlingsintervall: Se etikett	60 dagar	FMC

Ogräsmedel	Foramsulfuron + Tienkarbazon-metyl	Convigo One	50 + 30	5254	1,0 (0,5) max 2 ggr/år. 1,0 (1,0) max 1 gång/år.	Olika BBCH vid olika doser: 0,5 l/ha*2 gånger gäller BBCH 10-18 (hjärtblad till 8 örtblad). Vid dos på 1,0 l/ha*1 gång BBCH 14-18 (4-8 örtblad). Minst 10 dagar mellan behandlingarna.		Bayer A/S
Svampmedel	Azoxystrobin + Difenokonazol	Amistar Gold	125 + 125	5416	1,0 max 1 gång/år	BBCH 39-49 (radtäckning till skörd)	35 dagar	Syngenta
	Difenokonazol	Difcor 250 EC	250	5601	1,0 (0,5) max 2 ggr/år	BBCH 40-89	21 dagar. Blasen får ej användas till foder.	Globachem N.V.
	Pyraklostrobin	Comet Pro	200	5163	1,2 (0,6) max 2 ggr/år.	BBCH 34 - 49 Behandlingsintervall: Se etikett	28 dagar	BASF
	Svavel	Kumulus DF	800	3022	20 (10 kg) max 2 ggr/år.	BBCH 37-49 (radtäckning till skörd) Behandlingsintervall: Se etikett	15-sep	BASF
Snigelmedel	Järn(III)fosfat	SluXX HP	30	4893	32 (7 kg/ha) max 4 ggr/år.			W. Neudorff GmbH KG

*Siffror utan parentes anger högsta tillåtna dosering totalt över årets alla behandlingar av grödan, medan siffror med parentes anger högsta tillåtna dosering vid ett enskilt behandlingstillfälle.

** Centium 36 SC: Vid behandling skall 45 meters skyddsavstånd till känsliga områden (bebyggelse, trädgård, skolor etc.) användas. Gäller ej vid bekämpning innan uppkomst (20 april).

Glyfosat

Glyfosatanvändning är endast tillåten före betornas uppkomst, förutsatt att etiketten godkänner sådan användning.

Maxdos motsvarande 1500g verksam substans per ha.

Avstrykning kan tillåtas, men förutsätter samråd med Agricerter och att etiketten godkänner avstrykning.

OBS! Bekämpning av vildbetor eller stocklöpare med avstrykning är inte tillåtet!

Matrigan

Matrigan och andra produkter innehållande klopyralid får endast användas för punktbehandling av tistel och andra svårbekämpade ogräs där alternativa preparat saknas.