

Växtskyddsmedel som får användas i betodlingen 2020. Aktuell förteckning mars 2020.

Typ	Verksam substans	Preparat	Verksam substans, g/l(kg)	Reg.	maxdos/år*	Behandlingsintervall	Karenstid/sista behandlingsdag	Registreringsinnehavare
<u>Insektsmedel</u>	alfacypermetrin	Fastac 50	50	4530	0,5 (0,25) max 2 ggr/år.	BBCH 10-39 (hjärtblad till radtäckning)	14 dagar	BASF
	betacyflutrin	Beta-Baythroid CS 025	25	4365	0,8 (0,4) max 2 ggr/år.	Behandlingsintervall 14 dagar	28 dagar	ADAMA
Selektiva ogräsmedel	cykloksidim	Focus Ultra	100	5328	5,0 (5,0) max 1 gång/år.	BBCH 12-39 (2 örtblad till radtäckning)		BASF
	Fenmedifam + desmedifam	Betanal Power**	160 + 160	4868	1,8 (0,6) max 3 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad). Behandlingsintervall: Se etikett		Bayer AB
	Fenmedifam + desmedifam	Betasana Duo	80 + 80	5058	3,0 (1,0) max 3 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad). Behandlingsintervall: Se etikett. Får endast användas vart tredje år.		United Phosphorus Ltd
	Fenmedifam + desmedifam	Belvedere	160 + 160	5162	1,8 (3*0,6 eller 4*0,45) minst 8 dagar mellan beh. OBS! Skyddavstånd enl. "Hjälpredan".	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad)		ADAMA
	Fenmedifam	Betasana SC	160	4967	Bandspruta: 3,0 (1,0) max 3 ggr/år. Bomspruta 2,1 (0,7) max 3 ggr/år.	Bandspruta: BBCH 10-18 (hjärtblad till 8 örtblad). Bomspruta: BBCH 12-18 (2 till 8 örtblad).	90 dagar. Blasen får ej användas till foder.	United Phosphorus Ltd
	kletodim	Select	240	5468	1,0 (1,0) max 2 ggr/år.	BBCH 12-33. Behandlingsintervall 21 dagar	60 dagar	Nordisk Alkali
	kletodim	Select Plus	120	5293	2,0 (2,0) max 1 gång/år.	BBCH 12-33		Nordisk Alkali
	Propakizafop	Agil 100 EC	100	5232	1,5 (1,5) max 2 ggr/år. 14-28 dagar mellan behandlingar.	BBCH 00 - 32		ADAMA
	klopyralid	Matrigon 72 SG	720	5013	0,165 (0,165) max 1 gång/år.	BBCH 12-15 (2 till 5 örtblad)		Dow
		Matrigon 600 SL	720	5507	0,2 (0,2) max 1 gång/år.	BBCH 12-15 (2 till 5 örtblad)		Dow
	metamitron	Goltix SC 700	700	5259	3,0 (1,5) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Goltix WG	700	5261	3,0 (1,5) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Metafol 700 SC/Target SC	700	5264/5265	3,0 (1,0) max 4 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		United Phosphorus Ltd
	metamitron + kvinnmerak	Goltix Queen	525 + 40	5560	3,0 (1,5) max 3 ggr/år	BBCH 10-19 Behandlingsintervall: Se etikett. Får endast användas vart tredje år.		ADAMA
	triflusalufuron-metyl	Safari 50 DF	500	5424	120g (30g) max 4 ggr.	BBCH 10-31. Behandlingsintervall: Se etikett		Cheminova
	Etofumesat	Tramat SC 500	500	5374	0,45 (0,45) max 1 ggr/år. 0,5 (0,25) max 2 ggr/år. 0,42 (0,14) max 3 ggr/år.	Olika behandlingsstrategier får inte kombineras! BBCH 10 - 18 (hjärtblad till 8 örtblad). Behandlingsintervall: Se etikett		Bayer A/S
	Klomazon	Centium 36 CS***	360	4778	0,2 (0,05-0,2 per beh.) max 4 ggr/år.	BBCH 00-18 (innan uppkomst - 8 örtblad). Etiketten avråder från körning i stadie 07-12. Behandlingsintervall: Se etikett	60 dagar	FMC

Ogräsmedel	Foramsulfuron + Tienkarbazon-metyl	Conviso One	50 + 30	5254	1,0 (0,5) max 2 ggr/år. 1,0 (1,0) max 1 gång/år.	Olika BBCH vid olika doser: 0,5 l/ha*2 gånger gäller BBCH 10-18 (hjärtblad till 8 örtblad). Vid dos på 1,0 l/ha*1 gång BBCH 14-18 (4-8 örtblad). Minst 10 dagar mellan behandlingarna.		Bayer A/S
Svampmedel	Azoxystrobin + Difenokonazol	Amistar Gold	125 + 125	5416	1,0 max 1 gång/år	BBCH 39-49 (radtäckning till skörd)	35 dagar	Syngenta
	Pyraklostrobin	Comet Pro	200	5163	1,2 (0,6) max 2 ggr/år.	BBCH 34 - 49 Behandlingsintervall: Se etikett	28 dagar	BASF
	svavel	Kumulux DF	800	3022	20 (10 kg) max 2 ggr/år.	BBCH 37-49 (radtäckning till skörd) Behandlingsintervall: Se etikett	15-sep	BASF
Snigelmedel	Järn(III)fosfat	Sluxx HP	30	4893	32 (7 kg/ha) max 4 ggr/år.			W. Neudorff GmbH KG

*Siffror utan parentes anger högsta tillåtna dosering totalt över årets alla behandlingar av grödan, medan siffror med parentes anger högsta tillåtna dosering vid ett enskilt behandlingstillfälle.

** Produkten får även marknadsföras under namnet Kemifam Power.

*** Centium 36 SC: Vid behandling skall 45 meters skyddsavstånd till känsliga områden (bebyggelse, trädgård, skolor etc.) användas. Gäller ej vid bekämpning innan uppkomst (20 april).

Glyfosat

Glyfosatanvändning är endast tillåten före betornas uppkomst, förutsatt att etiketten godkänner sådan användning.

Maxdos motsvarande 1500g verksamt substans per ha.

Avstrykning kan tillåtas, men förutsätter samråd med Agricenter och att etiketten godkänner avstrykning.

OBS! Bekämpning av vildbetor eller stocklöpare med avstrykning är inte tillåtet!

Matrigo

Matrigo och andra produkter innehållande klopyralid endast får användas för punktbehandling av tistel och andra svårbekämpade ogräs där alternativa preparat saknas.