

Växtskyddsmedel som får användas i betodlingen 2017. Aktuell förteckning juli 2017.

Typ	Verksam substans	Preparat	Verksam sub- stans, g/l(kg)	Reg.	max dos/år*	Behandlingsintervall	Karenstid/sista behandlingsdag	Registreringsinnehavare
Insekts- medel	alfacypermetrin	Fastac 50	50	4530	0,5 (0,25) Max 2 ggr/år	BBCH 10-39 (Fram till radtäckning)	14 dagar	BASF
	betacyflutrin	Beta-Baythroid CS 025	25	4365	0,8 (0,4) Max 2 ggr/år.	Behandlingsintervall 14 dagar	28 dagar	ADAMA
Selektiva ogräsmedel	cykloxidim	Focus Ultra	100	3987	6,0 (3,0)		60 dagar	BASF
	Fenmedifam + desmedifam	Betanal Power**	160 + 160	4868	1,8 (0,6). Max 3 ggr/år.	BBCH 00 - 18 (tom 8 örtblad). Behandlingsintervall: Se etikett		Bayer AB
	Fenmedifam + desmedifam	Betasana Duo	80 + 80	5058	3,0 (1,0). Max 3 ggr/år.	BBCH 10 - 18 (tom 8 örtblad). Behandlingsintervall: Se etikett		United Phosphorus Ltd
	Fenmedifam + desmedifam	Belvedere	160 + 160	5162	1,8 (3*0,6 eller 4*0,45) minst 8 dagar mellan beh. OBS! Skyddavstånd enl. "Hjälpredan".	BBCH 10 - 18 (tom 8 örtblad)		ADAMA
	Fenmedifam	Betasana SC	160	4967	Bandspruta: 3 (1). Max 3 ggr/år. Bomspruta 2,1 (0,7). Max 3 ggr/år.	Bandspruta: BBCH 10-18. Bomspruta: BBCH 12-18.	90 dagar. Blasten får ej användas till foder.	United Phosphorus Ltd
	kletodim	Select	240	4376	2,0 (1,0)	BBCH 12-33. Behandlingsintervall 21 dagar	60 dagar	Nordisk Alkali
	Propakizafof	Agil 100 EC	100	5232	1,5 (1,5) 14-28 dagar mellan behandlingar.	BBCH 00 - 32.		ADAMA
	klopyralid	Matrigon 72 SG	720	5013	0,165 (0,165). Max 1 ggr/år	BBCH 12-15 (tom 5 örtblad)		Dow
	metamitron	Goltix SC 700	700	4237	6,0 (3,0) tom 8 blad, 4 ggr	BBCH 00 - 18 (tom 8 örtblad)		ADAMA
		Goltix SC 700	700	5259	3,0 (1,5) tom 8 blad, 4 ggr	BBCH 00 - 18 (tom 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Goltix WG	700	3297	5,0 (3,0)	BBCH 00 - 18 (tom 8 örtblad)		ADAMA
		Goltix WG	700	5261	3,0 (1,5) tom 8 blad, 4 ggr	BBCH 00 - 18 (tom 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
		Metafol 700 SC/Target SC	700	5264	3,0 (1,0) tom 8 blad, 4 ggr	BBCH 10 - 18 (tom 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		United Phosphorus Ltd
	triflusalufuron-metyl	Safari 50 DF	500	4187	120g (30g) max 4 ggr.	BBCH 10-31. Behandlingsintervall: Se etikett		DuPont
	Etofumesat	Ethosat 500 CS	500	5011	0,3 (0,3). 2 ggr/år.	BBCH 00 - 18 (tom 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett		ADAMA
	Klomazon	Centium 36 CS***	360	4778	0,2 (0,05-0,2 per beh.) Max 4 ggr/år.	BBCH 12-18 (tom 8 örtblad) Behandlingsintervall: Se etikett	60 dagar	Nordisk Alkali
Svamp- medel	azoxystrobin	Amistar	250	4219	2,0 (1,0). Max 2 beh. per år.	BBCH 37-39 (tom. radtäckning)	40 dagar	BASF
	Azoxystrobin	Mirador 250 CS	250	5021	2,0 (1,0). Max 2 beh. per år.	BBCH 37-39 (tom. radtäckning)	40 dagar	ADAMA
	Pyraklostrobin	Comet	250	4583	1,0 (0,5)	15 aug. - 1 okt.	30 dagar	BASF
	Pyraklostrobin	Comet Pro	200	5163	1,2 (0,6). Max 2 beh. per år.	BBCH 34 - 49 Behandlingsintervall: Se etikett	28 dagar	BASF
	Pikoxystrobin	Acanto	250	4773	1,0 (1,0) Max 2 behandlingar per år	Från BBCH 40 (Radtäckning) Behandlingsintervall: Se etikett	42 dagar	DuPont

Snigel- medel	Propikonazol	Barclay Bolt XL	250	5032	1,0 (0,5)	Juli - augusti	28 dagar	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
	Propikonazol + Difenokonazol	Armure	150+ 150	4902	0,6 (0,6). Max 2 beh. per år. Minst 21 dagar mellan behandlingar.	BBCH 39-49	21 dagar	Syngenta
	svavel	Kumulus DF	800	3022	20 (10 kg)	BBCH 37-49 Behandlingsintervall: Se etikett	15-sep	BASF
	Järn(III)fosfat	Sluxx HP	30	4893	32 (7 kg/ha). Max 4 behandlingar			W. Neudorff GmbH KG

*Siffror utan parentes anger högsta tillåtna dosering totalt över årets alla behandlingar av grödan, medan siffror med parentes anger högsta tillåtna dosering vid ett enskilt behandlingstillfälle.

** Produkten får även marknadsföras under namnet Kemifam Power.

*** Centium 36 SC: Vid behandling skall 45 meters skyddsavstånd till känsliga områden (bebyggelse, trädgård, skolor etc.) användas.

Glyfosat

Glyfosatanvändning är endast tillåten före betornas uppkomst, förutsatt att etiketten godkänner sådan användning.

Maxdos motsvarande 1500g verksam substans per ha.

Avstrykning kan tillåtas, men förutsätter samråd med Agricenter och att etiketten godkänner avstrykning.

OBS! Bekämpning av vildbetor eller stocklöpare med avstrykning är inte tillåtet!

Matrigan

Matrigan och andra produkter innehållande klorpyralid endast får användas för punktbehandling av tistel och andra svårbekämpade ogräs där alternativa preparat saknas.